

Prospektüs

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi Veteriner Endekstosit

BİLEŞİMİ

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi her ml'inde etken madde olarak 60 mg Selamectin içeren, izopropil alkol'de hazırlanmış berrak, açık sarı renkli bir solüsyondur.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ

Selamectin [(5Z,25S)-25cyclohexyl-4'-O-de (2,6-dideoxy -3-O-methyl- α -L-arabino-hexapyranosyl)-5-demethoxy-25-de(1-methylpropyl)-22-23-dihydro-5-hydroxyiminoavermectin A_{1a}] Selamectin avermectin sınıfından yarı-sentetik bir bileşiktir. Selamectin bu sınıftaki diğer bileşiklere benzer şekilde, nematod ve artropod sınıfından çok sayıda paraziti klor kanallarının oluşumunu engelleyerek normal sinir iletimini bozmak suretiyle felç ederek öldürür. Bu etki nematodlarda motor sinir hücrelerinin ve artropodlarda kas hücrelerinin elektrik iletimini durdurarak, bunları felç eder ve ölümüne neden olur. Önerilen dozlarda kullanılan Selamectin, ivermectin'e duyarlı Collie ırkı köpekleri de kapsayan geniş bir güvenlik marjına sahiptir.

Stronghold % 6 damlatma çözeltisi topical uygulama sonrası uygulama bölgesinden emilerek kan dolaşımına karışır. Topical uygulama sonrası biyoyararlanım köpeklerde % 4, kedilerde % 74'tür. Maksimum konsantrasyona (T max) köpeklerde 3 gün kedilerde 15 saatte ulaşılır. Yarılanma ömrü köpeklerde 11 gün kedilerde 8 gündür. Stronghold % 12 damlatma çözeltisi emilim sonrası intestinal doku ve deriye tekrar dağılım göstermektedir. İlaç başlıca dışkı ile atılmaktadır.

KULLANIM YERİ/ ENDİKASYONLAR

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi altı haftalıktan büyük köpek ve kedilerde aşağıdaki enfeksiyon ve enfestasyonlar için endikedir.

Köpek ve kedilerde pire enfestasyonlarının, ergin pirelere ve pire larva ve yumurtalarına etkinlik göstermek suretiyle tedavi edilmesi ve uzun süreli önlenmesi
Köpek ve kedilerde pireye bağlı allerjik dermatitis'in tedavisi ve önlenmesi
Köpek ve kedilerde <i>Dirofilaria immitis</i> 'e bağlı Kalp nematodiasis'inin (Heartworm) önlenmesi
Köpek ve kedilerde kulak uyuzunun (<i>Otodectes cynotis enfestasyonu</i>) tedavisi ve önlenmesi
Köpeklerde sarkoptik uyuzun (<i>Sarcoptes scabiei enfestasyonu</i>) tedavisi ve önlenmesi
Kedilerde kancalı kurtlar (<i>Ancylostoma tubaeformae</i>) ve Askarid'lerin (<i>Toxocara cati</i>) neden olduğu Ancylostomiasis ve Ascariadiasis'in tedavisi ve önlenmesi
Köpeklerde Askarid'lerin (<i>Toxocara canis</i>) neden olduğu Ascariadiasis'in tedavisi ve önlenmesi
Köpek ve kedilerde bit enfestasyonlarının (<i>Felicola subrostratus</i> , <i>Trichodectes canis</i>) tedavisi
Dişi köpek ve kedilerin tedavisi ile yavruların pire enfestasyonlarından (<i>Ctenocephalides spp.</i>) korunması

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi'nin dozu her kilogram vücut ağırlığı için minimum 6 mg'dır. STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi değişik ağırlıktaki köpek ve kedilere gerekli dozun verilmesini sağlamak için, 0.25 ve 0.75 ml hacimli tek dozluk tüplerde hazırlanmıştır. Aşağıdaki tablo farklı renk kodlu, tek doz tüplerin hangi vücut ağırlığındaki köpek ve kedilerde kullanılacağını göstermektedir.

Kedi (kg)	Uygulanan tüpün rengi	Uygulanan miktar (mg)	Potans (mg/ml)	Uygulanan hacim (uygulanan tüpün hacmi, ml)
<2.5	Pembe	15 mg	60	0.25
2.6-7.5	Mavi	45 mg	60	0.75
>7.5		Tüplerin uygun kombinasyonu	60	Tüplerin uygun kombinasyonu
Köpek (kg)	Uygulanan tüpün rengi	Uygulanan miktar (mg)	Potans (mg/ml)	Uygulanan hacim (uygulanan tüpün hacmi, ml)
<2.5	Pembe	15 mg	60	0.25

22 MART 2003



Doğru uygulama için öneriler

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi iki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki deriye topikal olarak uygulanır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tüpü koruyucu paket içerisinde çıkarılır. Tüp ağzı yukarı pozisyonda tutularak, kapak üzerine bastırılır ve aplikatör koruyucusu üzerinde bir delik açılır. Sonra kapak çıkartılır. İki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki tüyler aralanarak, küçük bir sahadaki deri açığa çıkarılır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tüpünün ucu deriye masaj yapmaksızın uygulanır. Tüp tamamen sıkılarak içeriğin tamamı bir nokta üzerine boşaltılır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin uygulayıcının parmakları ile temasından kaçınılmalıdır.

Eğer hayvanın tüyleri ıslak ise, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi uygulanmamalıdır. Bunun yanında, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi uygulamasından 2 saat sonra hayvanın şampuanlanması veya ıslanması, ilacın etkinliğinde herhangi bir azalmaya yol açmaz.

ÖZEL KLİNİK BİLGİLER VE HEDEF TÜRLER İÇİN UYARILAR

Pire enfestasyonlarının ergin pirelere ve pire larva ve yumurtalarına etkinlik göstermek suretiyle tedavi edilmesi ve uzun süreli önlenmesi

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi *Ctenocephalides sp.*'ni oluşturduğu pire enfestasyonlarının tedavisi ve uzun süreli önlenmesinde endikedir.

Hayvanın pireyle enfeste olduğu durumlarda, ilk STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi uygulaması hayvanın üzerindeki ergin pirelerin öldürülmesini sağlar. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi hayvanın yaşadığı çevrede bulunan pire larva ve yumurtalarına da etkilidir. Bu etki STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi ile tedavi edilen hayvanlardan dökülen selamectin içeren depris'in hayvanın yaşadığı çevrede bulunan pire yumurta ve larvaları ile temas etmesi ve larvaların STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi uygulanmış erginlerin selamectin içeren dışkısını yemesi sonucu olduğu düşünülmektedir. Bunun sonucunda hayvanın çevresinde bulunan diğer pire formlarının (larva ve yumurta) üreme ve çoğalması durdurulmuş olur. Sadece tek bir uygulamadan sonra, hayvanın yaşadığı ortamda pire popülasyonunda belirgin bir azalma gözlenir.

Pire enfestasyonlarının uzun süreli önlenmesi için STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi aylık olarak uygulanmalıdır. Bu uygulama hayvanı enfeste eden ergin pirelerin ve çevrede bulunan yumurta ve larvaların öldürülmesini garanti eder. Böylece pirenin hayat döngüsü kesintiye uğratılır ve pire enfestasyonları önlenir.

Pire'ye bağlı allerjik dermatitis: Tedavi ve önlenmesi

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi köpek ve kedilerde pirelere bağlı oluşan allerjik dermatitis'in kontrol ve tedavisinde endikedir. Şiddetli kaşınma semptomları gösteren hayvanlarda, uygulama başlangıcında semptomatik tedavi gerekli olabilir.


Kalp nematodiasis'inin (Heartworm enfeksiyonu) önlenmesi

Hastalık vektörlerinin mevcut olduğu ülkelerde *Dirofilaria immitis*'nin neden olduğu Kalp nematodiasis'inin önlenmesi için STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi aylık olarak uygulanmalıdır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi yıl boyunca yada en azından hayvanların sivrisineklerle ilk temasından sonraki bir ay içerisinde ve bunu izleyerek sivrisinek sezonunun sonuna kadar aylık olarak uygulanabilir. Son doz sivrisinek mevsiminin bitiminden sonraki ay'da uygulanmalıdır. Eğer bir doz atlanmış ve bir aylık doz aralığı aşılmış ise, STRONGHOLD'un vakit geçirilmeden uygulanması ve aylık doz rejiminin yeniden sağlanması, yetişkin kalp nematodların gelişmesine fırsat vermeyecektir. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin kalp nematodiasis'ine karşı kullanılan bir başka ürünün yerini alması söz konusu olduğunda, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin ilk dozu daha önce uygulanan ilacın son uygulanmasını izleyen ay içerisinde yapılmalıdır.

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi kalp nematodu ile enfekte hayvanlara güvenle uygulanabilir, ancak iyi Veteriner pratiği ile uyumlu olarak, endemik bölgelerdeki 6 aylık ve daha yaşlı hayvanlar, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi ile tedaviye başlamadan önce, hastalık yönünden incelenmelidir. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi ergin *Dirofilaria immitis*'e etkili değildir, ancak kan dolaşımındaki mikrofilyarların sayısını azaltabilir.

Kulak uyuzunun tedavisi ve önlenmesi

Kulak uyuzu etkeninin (*Otodectes cynotis*) eliminasyonu için, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tek bir doz olarak uygulanmalıdır. Bazı köpeklerde etkenin tamamen yok edilebilmesi için 2. doz gerekli olabilir. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin aylık kullanımı daha sonra olabilecek kulak uyuzunu önleyecektir. Tedavi edilen hayvanlarda enfeste kulağın içindeki pisliliğin alınarak, kulağın temizlenmesi önerilir.



Beytullah OKAY
Bakanlık
Genel Müdür Yardımcısı

Köpeklerde Sarkoptik uyuzun tedavisi ve önlenmesi

S. scabiei'nin neden olduğu Sarkoptik uyuzda etkenlerin tam olarak eliminasyonu için, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi birbirini izleyen iki ayda birer doz olarak uygulanmalıdır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin devam eden aylarda aylık olarak uygulanması olabilecek Sarcptes reenfestasyonlarını önleyecektir.

Kedilerde intestinal nematodiasis tedavisi ve önlenmesi

Kedilerde intestinal kancalı kurtların (*Ancylostoma tubaeformae*) neden olduğu Ancylostomiasis ve Askarid'lerin (*Toxocara cati*) neden olduğu Ascariasis'in tedavisi ve önlenmesi için, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tek bir doz olarak uygulanmalıdır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin aylık kullanımı kancalı kurt ve Askarid enfeksiyonlarını önleyecektir.

Köpeklerde intestinal nematodiasis tedavisi ve önlenmesi

Köpeklerde Askarid'lerin (*Toxocara canis*) neden olduğu Ascariasis'in önlenmesi için, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tek bir doz olarak uygulanmalıdır. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin aylık kullanımı Askarid enfeksiyonlarını önleyecektir.

Köpek ve kedilerde bit enfestasyonlarının (*Felicola subrostratus*, *Trichodectes canis*) tedavisi

Köpek ve kedilerde bit enfestasyonlarının tedavisi için STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tek bir doz olarak uygulanmalıdır.

Dişi köpek ve kedilerin tedavisi ile yavruların pire enfestasyonlarından (*Ctenocephalides spp.*) korunması
STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin dişi köpek ve kedilere son uygulama doğuma yaklaşık 2 hafta kala yapılmak üzere gebelik süresince aylık olarak uygulanması ve doğumdan sonraki 10. günden başlayarak aylık olarak uygulanmaya devam edilmesi güvenlidir ve yavrulardaki pire enfestasyonlarının önlenmesinde etkilidir.

İSTENMEYEN ETKİLER

Bu ürünün kedilerde kullanımı nadir olarak uygulama bölgesinde hafif seyirli ve geçici tüy dökülmesine neden olmuştur. Tüy dökülmesi normal olarak kendiliğinden düzelir, ancak bazı durumlarda semptomatik tedavi gerekebilir.

İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ

Tamamen kontrollü klinik çalışmalarda, STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi'nin aşılar, anthelmintikler, antiparaziterler, antibiyotikler, steroidler, tasmalar ve şampuanlar gibi yaygın kullanılan Veteriner ürünleri alan hayvanlarda güvenle kullanılabilirdiği görülmüştür

KONTRENDİKASYONLAR

Gebelik Ve Laktasyon Döneminde Kullanım:Güvenlik çalışmalarında, toplam 44 adet kedi ve köpeğe çiftleşme öncesi, gebelik dönemi boyunca ve doğumdan sonraki 42. güne kadar 28 gün aralıklarla 3X dozda Stronghold uygulanmıştır. Gebe hayvanlarda ve yavrularında herhangi bir yan etki gözlenmemiştir.

Altı haftalıktan küçük hayvanlarda kullanılmamalıdır

DOZ AŞIMINDA BELİRTİLER TEDBİRLER VE ANTİDOT

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi Collie'leri de içeren 100'den fazla saf ve melez köpek ırkı ile çeşitli melez ve 16 saf kedi ırkı üzerinde denenmiş ve herhangi bir istenmeyen reaksiyon gözlenmemiştir. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi aynı zamanda gebe ve süt veren hayvanlar, damızlık erkek ve dişiler ve 6 haftalık yada daha büyük köpek ve kedi yavrularında test edilmiştir. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi önerilen dozun 10 katı uygulanmış ve herhangi bir istenmeyen reaksiyon gözlenmemiştir. STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi kalp nematodu ile enfekte köpek ve kedilere önerilen dozun 3 katı ve ivermektine duyarlı Collie'lere önerilen dozun 5 katı uygulanmış ve herhangi bir istenmeyen reaksiyon gözlenmemiştir.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN TEDBİRLER VE HEDEF OLMAYAN TÜRLER İÇİN UYARILAR

*Bu ürün sadece deri yüzeyine uygulanır. Oral yada parenteral yolla uygulamayınız.

*Hayvanın tüyleri ıslak ise uygulamayınız.

*Kullandıktan sonra elleri yıkayınız. Göze temas meydana gelirse, hemen bol suyla yıkayınız.

*Uygulama bölgesi kuruyuncaya kadar tedavi edilen hayvanla temas etmeyiniz. Bu amaçla uygulamadan sonra yarım saat beklemek yeterli olacaktır. Uygulamadan en az iki saat sonrasına kadar, hayvanları yıkamayınız.

*Bu ürünü kullanılırken sigara içilmemelidir ve bir şey yenilmemelidir.

*Yanıcdır. Sıcaklık, kıvılcım, ateş ve diğer alevlenmeye neden olacak kaynaklardan uzak tutunuz.

Beysülhan ÖZKAYA
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz .

Miadı geçen ürünler kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi tüpleri koruyucu ambalajı içinde 30 C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 36 ay'dır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde alüminyum blister ile üzeri sarılmış Leylak rengi tüpler 1 dozluk yarı şeffaf plastik 3 tüp, Mavi renkli tüpler 1 dozluk yarı şeffaf plastik 3 tüp ve 6 tüp şeklinde sunulmuştur. Tüpler renklerle aşağıdaki gibi kodlanmıştır.

Pembe renkli tüp 0.25 ml % 6'lık solüsyon içerir. Uygulama ile 15 mg Selamectin verilmiş olur.

Mavi renkli tüp 0.75 ml % 6'lık solüsyon içerir. Uygulama ile 45 mg Selamectin verilmiş olur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler, Veteriner Hekim muayenehaneleri ve hayvan hastanelerinde satılır.

PROSPEKTÜS ONAY TARİHİ:

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI RUHSAT TARİHİ VE NO : 19.07.2001-8/714

RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Ortaköy, İstanbul

İMAL YERİ ADI VE ADRESİ

Pfizer Animal Health,

Division of Pfizer, Inc. One Pfizer Way Lee's Summit

Missouri 64081

Amerika Birleşik Devletleri

Pfizer overseas Hoge wei 10, 1930 Zavantem, Belgium'dan ithal edilmiştir.



Dış Ambalaj Etiketi

(PEMBE)

**Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi
Veteriner Endektosit**

BİLEŞİMİ

Her tüp 0.25 ml'sinde etken madde olarak 15 mg Selamectin içermektedir. Ağırlığı 2.5 kg'dan az olan köpeklerde kullanılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi aşağıdaki enfeksiyon ve enfestasyonlar için endikedir.

Köpek ve kedilerde pire enfestasyonlarının tedavisi ve uzun süreli önlenmesi; köpek ve kedilerde pireye bağlı allerjik dermatitis'in tedavisi ve önlenmesi; köpek ve kedilerde *Dirofilaria immitis*'e bağlı Kalp nematodiasis'inin (Heartworm) önlenmesi; köpek ve kedilerde kulak uyuzunun (*Otodectes cynotis*) tedavisi ve önlenmesi; köpeklerde sarkoptik uyuzun (*Sarcoptes scabiei*) tedavisi ve önlenmesi; kedilerde kancalı kurtlar (*Ancylostoma tubaeformae*) ve Askarid'lerin (*Toxocara cati*) neden olduğu Ancylostomiasis ve Ascariasis'in tedavisi ve önlenmesi; köpeklerde Askarid'lerin (*Toxocara canis*) neden olduğu Ascariasis'in tedavisi ve önlenmesi.

Uygulama şekli ve dozu:

Tüp içerisindeki çözeltinin tamamı (0.25 ml) vücut ağırlığı 2.5 kg'dan az olan köpeklere iki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki deriye topical olarak uygulanır.

Doğru uygulama için öneriler

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi tüpü koruyucu paket içerisinden çıkarılır. Tüp ağzı yukarı pozisyonda tutularak, kapak üzerine bastırılır ve aplikatör koruyucusu üzerinde bir delik açılır. Sonra kapak çıkartılır. İki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki tüyler aralanarak, küçük bir sahadaki deri açığa çıkarılır. STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi tüpünün ucu deriye masaj yapmaksızın uygulanır. Tüp tamamen sıkılarak içeriğin tamamı bir nokta üzerine boşaltılır. STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi'nin uygulayıcının parmakları ile temasından kaçınılmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz.

Miadi geçen ürünler kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi tüpleri koruyucu ambalajı içinde 30 C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü 36 ay'dır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

Karton kutu içerisinde alüminyum blister ile üzeri sarılmış, 1 dozluk yarı şeffaf plastik 3 ve 6 tüp şeklinde sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler, Veteriner Hekim muayenahaneleri ve hayvan hastanelerinde satılır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ RUHSAT TARİHİ VE NO: 19.07.2001/8/714

RUHSAT SAHİBİ ADI VE ADRESİ :Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Ortaköy, İstanbul

İMAL YERİ ADI VE ADRESİ :Pfizer Animal Health,

Division of Pfizer, Inc. One Pfizer Way Lee's Summit

Missouri 64081

Amerika Birleşik Devletleri

Pfizer overseas Hoge wei 10, 1930 Zavantem, Belçium'dan ithal edilmiştir.

İç ambalaj etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi

Veteriner Endektosit

Her tüp 0.25 ml'sinde etken madde olarak 15 mg Selamectin içermektedir.

Seri no:

Son kullanma tarihi:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Ortaköy, İstanbul

Beytullah OKAY
Bakan'a
Genel Müdür-Yardımcısı

Dış Ambalaj Etiketi

(MAVİ)

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır
STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi
Veteriner Endektosit

BİLEŞİMİ

Her tüp 0.75 ml'sinde etken madde olarak 45 mg Selamectin içermektedir. Ağırlığı 2.6-7.5 kg arasında olan kedilerde kullanılır.

KULLANIM YERİ/ENDİKASYONLAR

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi aşağıdaki enfeksiyon ve enfestasyonlar için endikedir.

Köpek ve kedilerde pire enfestasyonlarının tedavisi ve uzun süreli önlenmesi; köpek ve kedilerde pıreye bağlı allerjik dermatitis'in tedavisi ve önlenmesi; köpek ve kedilerde *Dirofilaria immitis*'e bağlı Kalp nematodiasis'inin (Heartworm) önlenmesi; köpek ve kedilerde kulak uyuzunun (*Otodectes cynotis*) tedavisi ve önlenmesi; köpeklerde sarkoptik uyuzun (*Sarcoptes scabiei*) tedavisi ve önlenmesi; kedilerde kancalı kurtlar (*Ancylostoma tubaeformae*) ve Askarid'lerin (*Toxocara cati*) neden olduğu Ancylostomiasis ve Ascaridiasis'in tedavisi ve önlenmesi; köpeklerde Askarid'lerin (*Toxocara canis*) neden olduğu Ascaridiasis'in tedavisi ve önlenmesi.

UYGULAMA ŞEKLİ VE DOZU

Tüp içerisindeki çözeltinin tamamı (0.75 ml) vücut ağırlığı 2.6-7.5 kg arasında olan kedilere iki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki deriye topical olarak uygulanır.

Doğru uygulama için öneriler

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi tüpü koruyucu paket içerisinde çıkarılır. Tüp ağzı yukarı pozisyonunda tutularak, kapak üzerine bastırılır ve aplikatör koruyucusu üzerinde bir delik açılır. Sonra kapak çıkarılır. İki omuz arasında, boynun başlangıç kısmındaki tüyler aralanarak, küçük bir sahadaki deri açığa çıkarılır. STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi tüpünün ucu deriye masaj yapmaksızın uygulanır. Tüp tamamen sıkılarak içeriğin tamamı bir nokta üzerine boşaltılır. STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi'nin uygulayıcının parmakları ile temasından kaçınılmalıdır.

GENEL UYARILAR

Kullanmadan önce veteriner hekime danışınız

Çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutunuz. Gıda maddelerinden uzak tutunuz .

Miadi geçen ürünler kullanılmamalıdır.

MUHAFAZA ŞARTLARI VE RAF ÖMRÜ

STRONGHOLD % 6 Damlatma Çözeltisi tüpleri koruyucu ambalajı içinde 30 C'nin altında saklanmalıdır. Raf ömrü 36 ay'dır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

Karton kutu içerisinde alüminyum blister ile üzeri sarılmış, 1 dozluk yarı şeffaf plastik 3 ve 6 tüp şeklinde sunulmuştur.

SATIŞ YERİ VE ŞARTLARI

Veteriner hekim reçetesi ile eczaneler, Veteriner Hekim muayenahaneleri ve hayvan hastanelerinde satılır.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞININ RUHSAT TARİHİ VE NO: 19.07.2001/ 8/714

RUHSAT SAHİBİ VE ADRESİ :Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Ortaköy, İstanbul

İMAL YERİ ADI VE ADRESİ

Pfizer Animal Health,

Division of Pfizer, Inc. One Pfizer Way Lee's Summit

Missouri 64081

Amerika Birleşik Devletleri

Pfizer overseas Hoge wei 10, 1930 Zaventem, Belgium'dan ithal edilmiştir.

İç Ambalaj Etiketi

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır

STRONGHOLD %6 Damlatma Çözeltisi

Veteriner Endektosit

Her tüp 0.75 ml'sinde etken madde olarak 45 mg Selamectin içermektedir.

Seri no:

Son kullanma tarihi:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. Ortaköy, İstanbul

22 MART 2005

