

ÜRÜN ADI	RİSPOVAL
TARİH	20.04.2005
EBAT	295 x 120 mm
RENK	
KOD NO	5445
CİNSİ	PROSPEKTÜS



Rispoval®



IBR-Marker İnaktif Aşı

Kullanıma Hazır Süspansiyon 20 ml=10 Doz



Sığır için

Sadece Hayvan Sağlığında Kullanılır.

Sığırlar için inaktif, gE-negatif, IBR (Infectious Bovine Rhinotracheitis) - Marker aşısı. IBR hastalığına karşı sığırların aktif olarak immunize edilmesi için kullanılır.

Bileşimi:

Bir doz (2 ml):

- Kimyasal olarak inaktive edilmiş min. 10^{8.0}TCID₅₀* doz gE-negatif IBR-Marker virüsü
- Alüminyum hidroksit 18,6 mg
- Saponin 0,25 mg
- Timerosal max. 0,2 mg içerir.

*Doku kültüründe %50 (inaktivasyona eşdeğer) enfeksiyöz dozu.

Sığır böbrek hücre kültürlerinde üretilmiştir.

Kullanım Alanları:

Sığırlarda, IBR (Infectious Bovine Rhinotracheitis) virüsünün neden olduğu solunum yolu hastalıklarının profilaksisinde ve enfekte hayvanlardan virüs çıkartımının azaltılmasında endikedir. Sığırlar, daha önce klasik aşı virüsü ile immunize edilmemiş ya da saha virüsü ile enfeksiyon geçirmemişlerse, marker aşı ile immunize edildiklerinde, saha virüsü ile enfekte olmuş sığırlardan Anti-IBR gE ELISA kullanılarak yapılan serolojik test ile ayırt edilebilirler.

Kontrendikasyonlar:

Hastalanmış ya da ciddi parazit enfestasyonuna maruz kalmış sığırlara aşı uygulaması yapılmamalıdır.

Yan Etkiler:

Enjeksiyon bölgesinde 14 gün içinde normale dönen geçici bir şişlik olabilir.

Diğer İlaçlarla Kullanımı:

Kortikosteroidler gibi immun sistemi baskılayıcı preparatlar bağışıklık oluşumunu etkileyebileceklerinden, aşılanmanın 7 gün öncesi ve sonrası arası kalan sürede aşı uygulaması yapılmamalıdır.

Doz ve Uygulama:

3 aylıktan büyük sığırlar için doz, kullanıma hazır aşı süspansiyonunun 2 ml'sidir. Aşı maddesi kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Kullanıma hazır sulu süspansiyon, aseptik koşullar altında derialtı yolla kullanılır.

Aşı Programı:

Aşı programı, temel aşılama ve aşı tekrarlarından oluşmaktadır. Temel immunizasyon, 3-5 hafta ara ile 1 dozluk (2 ml) 2 enjeksiyonla yapılır. Aşı tekrarları, 6 ay aralıklarla 1 doz olarak uygulanır. 3 aylıktan küçük danalrın aşılanmasında, maternal antikolar bağışıklık oluşumunu engelleyebilir. Bu nedenle hayvanlar, 3 aylarını doldurduktan sonra yeniden aşılanmalıdır.

Muhafaza:

Aşılar, +2°C - +8°C'ler (buzdolabı ısısı) arası sıcaklıklarda saklanmalıdır. Dondurulmamalı, aşırı ısı ve ışıktan korunmalıdır.

Stabilite:

Önerilen saklama koşullarında, etkisini paket üzerinde belirtilen son kullanım tarihine kadar korur. Bu koşullarda alınan aşı maddesi 8 saat içinde kullanılmalıdır.

Kullanmadan önce Veteriner Hekime danışınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde bulundurunuz.

Bekleme süresi: Yok.

Ek Bilgiler:

Rispoval® IBR-Marker inaktif aşı, yeni bulgularla geliştirilmiş ve AB yönetmelikleri uyarınca kapsamlı saha ve laboratuvar deneyleriyle tolerabilite ve etkinlik bakımından test edilmiştir. Deneysel kontrollü enfeksiyonlar ve saha denemeleri, yaşamın 3. ayından itibaren aşı maddesi uygulamasının, BHV-1'e (Bovine Herpes Virus tip 1) karşı 6 ay süren güçlü bir bağışıklık etkisine sahip olduğunu göstermiştir. Böylelikle Rispoval® IBR-Marker inaktif aşı uygulaması, BHV-1'e karşı modern bir mücadele programının yürütülmesine olanak tanımaktadır. Klasik BHV-1 aşı uygulamaları, BHV-1 enfeksiyonlu hayvanların belirlenmesine yönelik tanı yöntemlerini etkilemektedir. Aşılanmış hayvanlar, saha virüsü ile enfekte olmuş hayvanlardan ayırt edilemezler. Rispoval® IBR-Marker inaktif aşı kullanımı ile, özel olarak bu aşı için geliştirilmiş serolojik test kiti ile (Kit herdCheck Anti-IBR gE Ab. ELISA), aşılanmış hayvanlar ve saha virüsü ile enfekte olmuş hayvanların birbirlerinden ayrılması mümkün olmaktadır. Enfekte olmamış sığırlar dahil tüm hayvanların aşılanması, bütün sürüde klinik koruma sağlar, olası BHV-1 saha virüslerinin yayılımı azalır ve BHV-1 saha virüsü bulunmayan sığırların enfeksiyon riski düşer. Rispoval® IBR-Marker inaktif aşının sürekli uygulanması, BHV-1 saha virüslerinin aşılanan sürüden elimine edilmesine katkıda bulunur.

Ruhsat Tarihi ve No: 08.11.2000 032297

Ruhsat Sahibi:

Pfizer İlaçları Ltd. Şti. 34347 Ortaköy / İstanbul

İmal Yeri:

Bayer AG
Animal Health Business Group
D-51368 Leverkusen
www.bayer-animal-health.com

KONU:	NOT					
	İMZA					
	İSİM					
	TARİH					
	BÖLÜM					
	RUHSAT					
	MEDİKAL					
PAZARLAMA						
KALİTE GÜVENÇE						
ÜRETİM						
TEKNİK RUHSAT						

