

ULTRABAC® 8

Pfizer Hayvan Saęlığı

Bakterin-Toksoid

Clostridium chauvoei-septicum-haemolyticum-novyi-sordellii- C ve D Tipi perfringens Bakterini-Toksoidi

Aktif Maddeler: Bu mamul öldürölmüş, standardize edilmiş ve adjuvant eklenmiş, Clostridium chauvoei, Cl. septicum, C. haemolyticum, C. novyi, C. sordellii, C. perfringens C ve D Tipi kùltürlerinden oluşmaktadır.

Endikasyonları: Yanıkara hastalığı (Cl. Chauvoei), malign ödem veya Bradzot (C. septicum), İnfeksiyöz nekrotik hepatitis (C. novyi), İnfeksiyöz ikter basiller hemoglobüri (C. haemolyticum), Clostridium sordellii enfeksiyonu ve Clostridium perfringens C ve D tipi enterotoksemi hastalıklarının önlenmesi için saęlıklı inek ve koyunlarda kullanılır. C. perfringens B tipi tarafından üretilen beta ve epsilon toksinlerine karşı baęışıklık, C tipi (beta) ve D tipi (epsilon) fraksiyonlarının kombinasyonlarına karşı oluşturulan baęışıklıkla saęlanır.

Doz ve Uygulama: Kullanmadan önce iyice çalkalanmalıdır. Aseptik şartlar altında subkutan veya intramüsküler yolla ineklere 5 mL ve koyunlara 2 ½ mL enjekte edilir ve dört (4) ile altı (6) hafta sonra aşı tekrarlanır. C. haemolyticum için, etkene yeniden maruz kalabilecek hayvanlarda doz her beş (5) ila altı (6) ayda bir

tekrarlanır.

Besiye alınacak veya halihazırda besiye alınmış olan hayvanlarda enjeksiyonun sadece subkutan yolla yapılması tavsiye edilir.

Yüksek düzeyde bağışıklık sağlamak için aşı her yıl tekrarlanmalıdır.

Dikkat Edilecek Hususlar: 1.5°-7°C'de saklanmalıdır.

Dondurulmamalıdır. Kesimden önceki 21 gün içinde aşı yapılmamalıdır. Aşı kullanılmaya başlandıktan sonra muhteviyatının tamamı kullanılmalıdır. Biyolojik ürünlerin kullanımından sonra anafilaktik reaksiyonlar meydana gelebilir. Epinefrin dahil, semptomatik tedavi uygulanmalıdır.

Takdim Şekli: 10 dozluk, 50 dozluk ve 200 dozluk ve renk kodlu etiketli plastik flakonlarda.

Sadece hayvan sağlığında kullanılır.