

ULTRACHOICE™ 8

Pfizer Hayvan Saęlıęı Bakterin Toksoid

Clostridium chauvoei- *septicum*- *haemolyticum*- *novyi*- *sordellii*- *perfringens* tip C ve D bakterin- toksoid

Tanımı: Bu ürün *Clostridium chauvoei*, *Cl. septicum*, *Cl. haemolyticum*, *Cl. novyi*, *Cl. sordellii*, ve *Cl. perfringens* tip C ve D'nin inaktive edilmiş, standard kültürlerinden özel suda çözünen adjuvant ile (Stimugen™) hazırlanmıştır. Koruyucu madde olarak formalin içerir.

Endikasyonları: Saęlıklı sığır ve koyunda *Cl. chauvoei* tarafından oluşturulan yanıkara, *Cl. septicum* tarafından oluşturulan malignan ödem, *Cl. hemolyticum* tarafından oluşturulan basiller haemoglobinüri, *Cl. novyi* tarafından oluşturulan infeksiyöz nekrotik hepatitis, *Cl. sordellii* tarafından oluşturulan gazlı gangren ve *Cl. perfringens* tip B, C ve D tarafından oluşturulan enterotoksemi ve enteritis'e karşı korunmada kullanılır. *Cl. perfringens* tip B'ye karşı baęışıklık Tip C'nin beta ve Tip D'nin epsilon toksoidleri ile saęlanmaktadır.

Uygulama: İyice çalkalayın. Sığır: aseptik olarak kas içi veya deri altı yolla 2 ml uygulanır. Saęlıklı sığırlara 4-6 hafta arayla 2 doz uygulanmalıdır. Koyun: aseptik olarak boyun bölgesinden kas içi veya deri altı yolla 1 ml uygulanır. Bunu 4-6 hafta sonra ikinci doz izlemelidir. Tüm aşılmalarda olduęu gibi, aşılama sonrası enjeksiyon bölgesindeki doku hasarını önlemek için deri altı uygulama önerilmektedir. *Cl. hemolyticum* için etkene tekrar maruz kalması söz konusu olan hayvanlara her 6 ay bir doz uygulanmalıdır. Her sene tek doz tekrar aşılama tavsiye edilir.

Muhafaza şartları: Bu aşı 2-7 C'ler arasında muhafaza edilmelidir. Dondurulmamalıdır. Şişe bir kez açıldığında içerięin tamamı kullanılmalıdır.

Yasal arınma süresi: Kesimden 21 gün önce hayvanlar aşılanmamalıdır.

Yan etkiler: Uygulama sonrası enjeksiyonun yapıldığı bölgede geçici bir şişkinlik oluşabilir. Dięer aşılarla olduęu gibi, uygulama sonrası anafilaksi meydana gelebilir. Bařlangıç antidotu epinefrin tavsiye edilir, bunu uygun destekleyici tedavi izlemelidir.

Ticari řekli: 10, 50, 250 dozluk şişelerde sunulmuştur.

Tarım ve Köyiřleri Bakanlıęı izin tarih ve no'su: 14.11.2000 / HSHD-VLHŞ-09-10843